

Informacje dla kobiet ciężarnych, u których badania wykazały zakażenie kiłą

Ta broszura jest przeznaczona dla kobiet, które poinformowano po przeprowadzeniu badań prenatalnych, że mogły być w przeszłości lub mogą być obecnie zakażone kiłą.

Broszura zawiera informacje o:

- kile u ciężarnych kobiet
- jaki wpływ kiła może mieć na dziecko
- możliwościach leczenia w okresie ciąży

Co to jest kiła?

Kiła (syfilis, syfilizm) jest poważnym zakażeniem bakteryjnym. Zarażenie się kiłą objawia się czasem początkowo jedynie krótkim okresem złego samopoczucia i zarażona osoba może nie zdawać sobie z tego sprawy. Jeżeli jednak kiła nie jest leczona, może w przyszłości spowodować poważne problemy zdrowotne, m.in. uszkodzenie mózgu i choroby serca.

Co oznacza wynik mojego badania krwi?

Pozytywny wynik badania nie oznacza, że na pewno jesteś zarażona kiłą. Wyniki badania przesiewowego na obecność kiły są czasem trudne do zrozumienia. Musi je zobaczyć specjalista, który następnie zada Ci pytania dotyczące Ciebie i przebytych infekcji. Czasem wynik badania jest pozytywny ze względu na zakażenie kiłą w przeszłości, pomimo że została już wyleczona. Wynik pozytywny mogą spowodować także inne, mniej poważne choroby.

Zakażenie kiłą można skutecznie wyleczyć antybiotykami.

Co teraz?

W przypadku pozytywnego wyniku badań przesiewowych zostaniesz w trybie pilnym umówiona na wizytę u lekarza specjalisty. W celu postawienia diagnozy lekarz zada Ci szereg pytań dotyczących Ciebie i ewentualnych przypadków zakażenia w przeszłości. Jeżeli lekarz stwierdzi, że jesteś zarażona kiłą, postanowi on, jaką metodę leczenia zastosować. Udzieli on Tobie wsparcia i odpowie na Twoje pytania.

Jeżeli jesteś zarażona kiłą, bardzo ważne jest skuteczne wyleczenie Cię, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia infekcji na Twoje dziecko w okresie ciąży. Zakażenie płodu mogłoby spowodować poronienie, martwy poród lub zaburzenia rozwojowe dziecka.

Położna pomoże Ci zaplanować opiekę medyczną i omówi z Tobą wszystkie możliwości.

Jak to się stało, że zostałam zarażona kiłą?

Zarażenie kiłą następuje w wyniku współżycia seksualnego (też seksu oralnego) z zakażoną osobą bez zabezpieczenia (prezerwatywy).

Jak mogę się leczyć?

Jeżeli jesteś chora na kiłę, lekarz specjalista porozmawia z Tobą o sposobie leczenia. Dostaniesz antybiotyki. Po zastosowaniu antybiotyków zostanie zbadana Twoja krew aby sprawdzić, czy infekcja została całkowicie zwalczona.

Jaki wpływ kiła będzie miała na moją ciążę?

Jeżeli zostaniesz wyleczona, kiła nie wpłynie na pozostały okres Twojej ciąży. Infekcja nie spowoduje konieczności przeprowadzenia cesarskiego cięcia, będziesz też mogła karmić piersią.

Jaki wpływ kiła będzie miała na moje dziecko?

Im wcześniej zaczniesz leczenie antybiotykami, tym mniejsze ryzyko zarażenia Twojego dziecka kiłą. Jeżeli infekcja została wykryta w zaawansowanym etapie ciąży, płód może zostać zarażony. Pediatra zbada dziecko wkrótce po urodzeniu. Będzie potrzebny szereg badań krwi, aby stwierdzić, czy dziecko jest zarażone kiłą i czy potrzebuje antybiotyków.

Jeżeli nie dokończysz leczenia, prawdopodobieństwo zarażenia dziecka w okresie ciąży będzie bardzo duże. Mogłoby to być niezwykle niebezpieczne dla dziecka: może ono umrzeć przed urodzeniem lub urodzić się z szeregiem poważnych problemów zdrowotnych.

Czy moje dziecko będzie potrzebować antybiotyków?

Twoje dziecko może potrzebować antybiotyków po urodzeniu, zwłaszcza gdy dano Tobie antybiotyki dopiero w późnej fazie ciąży, ponieważ istnieje wciąż ryzyko, że dziecko jest zarażone. Antybiotyki podawane są zwykle przez wstrzyknięcie.

Komu mam powiedzieć o tym, że jestem zarażona kiłą?

Jest ważne, żeby o tym powiedzieć obecnemu partnerowi seksualnemu i byłym partnerom seksualnym. Powinni oni rozważyć poddanie się badaniu, aby podjąć leczenie gdyby okazało się, że są zarażeni. Jeżeli masz obecnie partnera, możesz poprosić lekarza specjalistę o poradę, jak wyjaśnić mu Twoje zakażenie. Możesz też powiedzieć specjaliście, czy chcesz, aby o Twoim zakażeniu dowiedział się Twój lekarz domowy. Wyleczona kiła nie powraca, chyba że się zarazisz ponownie.

Poufność informacji

Aby zapewnić Tobie i Twojemu dziecku możliwie najlepszą opiekę, będziemy musieli zaangażować też innych specjalistów. Z tego powodu położna poprosi Cię o pozwolenie na dzielenie się informacjami o Tobie, zanim zaangażują się oni w opiekę nad Tobą.

Gdzie mogę uzyskać dalsze informacje?

Dalsze informacje na temat kiły możesz otrzymać:

- od szpitalnej położnej specjalizującej się w badaniach prenatalnych lub od lekarza (ginekologa-położnika) w szpitalu;
- w najbliższej poradni zdrowia seksualnego NHS (w książce telefonicznej można ją znaleźć pod „GUM” (genito-urinary medicine – medycyna moczowo-płciowa) – możesz zadzwonić do najbliższego szpitala i zapytać o taką poradnię (GUM clinic);
- za pośrednictwem czynnej przez całą dobę telefonicznej infolinii NHS Direct – 0845 46 47;
- na witrynie internetowej NHS – www.nhsdirect.nhs.uk;
- na witrynie internetowej walijskiej służby zdrowia – www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/43750; and
- na witrynie internetowej NHS Choices – www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx.

© Copyright 2010 Public Health Wales NHS Trust. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części bez pozwolenia właściciela praw autorskich jest zabronione.

www.antenatalscreening.org

Lipiec 2010

SP 2nd edition