

رحم کے سرطان (سرویکل کینسر)
سے محفوظ رہنے میں مدد
کرتے ہوئے

www.screeningservices.org



Cervical Screening **Wales**
Sgrinio Serffigol **Cymru**



اس پرچے کا مقصد آپ کو وہ
معلومات مہیا کرنا ہے جو آپ کو
سرویکل کینسر سے محفوظ
رکھنے میں مددگار ثابت
ہوسکیں۔ آپ باقاعدگی
سے سرویکل سکریننگ (طبی
جانچ) کے لیے جانے سے
سرویکل کینسر کے نشوونما
کے مواقع کو کم کر سکتی ہیں۔

”ویلز میں تمام خواتین یہ کروا رہی ہیں“
اگر آپ کی عمر 20 سے 64 سال ہے تو ہم آپ کو ہر تین
سال کے بعد ایک سمنیٹیسٹ (طبی معائنے کے لیے نمونہ
حاصل کرنا) کے لیے مدعو کریں گے۔

ورژن 1.0 مارچ 09


سرویکل کینسر 35 سال سے کم عمر کی خواتین میں موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے، لیکن یہ تمام عمر کی خواتین پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔

ہم (سرویکل سکریننگ ویز) ویز میں این ایچ ایس کے سرویکل سکریننگ پروگراموں پر عمل درآمد کے ذمہ دار ہیں۔

آپ کو کیا پتہ ہونا چاہیے

- سرویکل سکریننگ کو 'سمئر ٹیسٹ' کے طور پر جانا جاتا ہے۔
- سرویکل سمئر کینسر کے لیے جانچ نہیں ہے۔ اس کا ہدف کینسر کو پھیلنے سے روکنا ہے، لیکن بعض اوقات یہ کینسر کا پتہ بھی چلا سکتا ہے۔
- سمئر ٹیسٹ خلیوں میں غیر معمولی تبدیلیوں کا پتہ چلاتے ہیں جو زیادہ تر انسانی پیپیلوما وائرسوں (ایچ پی ویز) کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔
- وہ ایچ پی ویز جو سرویکل کینسر کا باعث بنتے ہیں جنسی عمل کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔
- ایچ پی ویز رحم کے خلیوں میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں جو سرویکل کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔
- 12 سے 13 سالہ لڑکیاں ویکسین لے سکتی ہیں جو انہیں بعض اقسام کے ایچ پی ویز سے بچا سکتی ہے۔ زیادہ عمر کی 18 سال سے کم عمر لڑکیاں ایک کیچ - اپ پروگرام کے تحت ویکسین لیں گیں۔

سروکس (عنق رحم) کیا ہے؟



آپ کا سروکس آپ کی بچہ دانی کا نچلا حصہ ہے (جسے 'یوٹرس' بھی کہا جاتا ہے)۔ (آپ کے سروکس کو 'بچہ دانی کی گردن' بھی کہا جاتا ہے)۔ آپ کے سروکس کا آپ کے اندام نہانی کے اوپری آخری حصے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔

سرویکل کینسر

آپ کے سروکس پر غیر معمولی خلیے سرویکل کینسر کی شکل لے سکتے ہیں۔

سرویکل کینسر آپ کے جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل سکتا ہے، بشمول آپ کی بچہ دانی اور آنت کے۔

بعض ایچ پی ویز سرویکل کینسر کی مرکزی وجہ ہیں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتی ہیں، تو یہ سرویکل کینسر پھیلنے کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔

سمئیر ٹیسٹ کیا ہے؟

سمئیر ٹیسٹ خلیوں کا نمونہ لے کر آپ کے سروکس کی صحت مندی کا معائنہ کرتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ فوری اور سادہ ہوتا ہے اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض خواتین اس سے بے آرامی محسوس کر سکتی ہیں۔ اگر غیر معمولی خلیے ملتے ہیں، تو آپ کو سرویکل کینسر کو نشوونما پانے سے روکنے کے لیے علاج کروانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

سمئیر ٹیسٹ کیوں کروانا چاہیے؟

سمئیر ٹیسٹ باقاعدگی سے کروانا سرویکل کینسر کے تقریباً 75% کیسوں کو نشوونما پانے سے روک سکتا ہے لیکن، کسی بھی جانچ کے دوسرے ٹیسٹ کی طرح، یہ 100% قابل بھروسہ نہیں ہے۔

ٹیسٹ کیسے کیا جائے گا؟

ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے وقت پر مدعو کریں گے۔ آپ کی مقامی سرجری یا جنسی صحت کے کلینک میں ایک ڈاکٹر یا پریکٹس نرس آپ کے ٹیسٹ کو سرانجام دے گا / گی۔ ٹیسٹ کرنے والا/ والی آپ کے سروکس کو دیکھنے کے لیے ایک سپیکیولم (پھیلا کر دکھانے والا طبی آلہ) آپ کی شرمگاہ میں داخل کرے گا / گی۔ وہ خلیوں کا نمونہ لینے کے لیے ایک چھوٹا بُرش استعمال کرتے ہیں اور پھر خلیے ایک لیبارٹری کو بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کو ایک خوردبین کے نیچے دیکھا جاسکے۔

سمئیرٹیسٹ کیوں کروانا چاہیے؟

• ہم آپ کی 20 سال سے 64 سال کی عمر کے دوران ہر تین سال کے بعد آپ کو ایک سمئیرٹیسٹ کے لیے مدعو کریں گے۔ اگر آپ کی عمر 64 سال سے زیادہ ہے تو آپ کا سمئیرٹیسٹ صرف تب ہو سکتا ہے اگر آپ کا پہلے کبھی ٹیسٹ نہیں ہوا۔

• اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کنواری ہیں (جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی جنسی عمل سرانجام نہیں دیا) یا نہیں یا آپ مختلف جنس یا ایک ہی جنس کے ساتھ جنسی تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کو اس کے باوجود سمئیرٹیسٹ کے لیے آنا چاہیے جب بھی ہم آپ کو مدعو کریں۔

ایچ پی سی ویکسین

12 سے 13 سالہ بچیوں کے لیے ایچ پی وی ویکسین سکول امیونائزیشن پروگرام کے تحت موجود ہے۔ ویکسین کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، این ایچ ایس امیونائزیشن ویب سائٹ ملاحظہ کریں (تفصیلات کے لیے صفحہ 7 دیکھیں)

اگر آپ ایچ پی وی ویکسین لے چکی ہیں، اس کے باوجود یہ اہم ہے کہ آپ سمئیرٹیسٹ کے لیے جائیں جب بھی آپ کو اس کے لیے مدعو کیا جائے۔

سرویکل کینسران خواتین میں زیادہ عام ہے جو:

- جو ٹیسٹ کے لیے نہیں جاتیں جب انہیں دعوت دی جاتی ہے
- بہت سے افراد کے ساتھ جنسی عمل سرانجام دے چکی ہیں (یا ان کا کسی ایسے فرد کے ساتھ جنسی تعلق ہے جو بہت سے افراد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرچکا ہے)
- کنڈوم استعمال نہیں کرتیں، یا
- سگریٹ نوشی کرتی ہیں۔

کوئی خاتون خود اپنی مدد کیسے کر سکتی ہے؟

سرویکل کینسر کا آغاز ہمیشہ علامات ظاہر نہیں کرتا چنانچہ یہ اہم ہے کہ سمئیرٹیسٹوں کے لیے باقاعدہ جایا جائے۔ یہ بھی اہم ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جایا جائے چاہے آپ کے سمئیرٹیسٹ کا نتیجہ معمول کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔

- اندام نہانی سے رطوبت کا خلاف معمول طور پر بہنا
- آپ کی ماہواریوں کے درمیان خون کا اخراج
- جنسی عمل کرنے کے دوران یا بعد میں خون کا بہنا یا تکلیف
- حیض کے بند ہونے کے عمل سے گزرنے کے بعد خون کا اخراج

سمئیرٹیسٹ - یہ کروائیں۔

مزید معلومات یا مشورے کے لیے، مندرجہ ذیل ویب سائٹیں ملاحظہ کریں۔

سرویکل سکریننگ ویلز
www.screeningservices.org/csw

این ایچ ایس سرویکل سکریننگ
www.cancerscreening.nhs.uk

ٹل ہر (Tell Her)
www.tellher.com

جوڑٹرسٹ (Jo's Trust)
www.jotrust.co.uk

این ایچ ایس امیونائزیشن انفارمیشن
www.immunisation.nhs.uk/hpv

کینسر ریسرچ یو کے
www.cancerresearchuk.org

بیٹنگ سرویکل کینسر
[new.wales.gov.uk/
beatcervicalcancer/home](http://new.wales.gov.uk/beatcervicalcancer/home)

